

藥後。大便又滯澀一次。惟不能硬結。其心中似有難受之意。遂將方中滑石生石膏各減半。煎湯一大盅。分兩次服。每次送安宮牛黃丸半。遂全愈。

天津南門外舊家大橋。周姓幼女。年四歲。於孟夏上旬出疹。喘息甚粗。鼻熱煽動。周身壯熱。渴喜飲水。其唇乾裂齒齦。脈象洪滑異。爲開白虎湯。加連翹銀連。方中生石膏用二兩。煎湯兩盅。分三次溫飲下。翌日視之。其熱不退。遂將方中生石膏改用三兩。煎湯兩大盅。俾分數次。徐徐溫飲下。又翌日視之。其熱已退強半。而大便自飲藥後。甚澀兩次。診其脈仍有力。遂改用滋陰宣解湯。服一劑。泄瀉即愈。然仍有餘熱未淨。遂於原方中。再加生石膏六錢。煎服一劑。熱遂盡消。惟便石所載三案。醫界同人。必有興趣好。用生石膏者不知石膏原係統質輕鈣化合物。陰中有陽。涼而能散。故神農本草。謂其微寒。非多用不能藥也。所最忌者燥用耳。燥之劑性同火。可點豆腐且可作洋灰。用至六七錢。即可使人性命。慎之慎之。

**試病法二則**

(楊舒榮)

**本報特聘** **徐元誥** **羅家衡** **大律師** **為常年法律顧問**  
電話 二〇八六  
 事務所 北京路四十六號

風流小病

世惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。水也掙得出的肌膚。再配上幾件時髦的衣服。逛逛馬路。白相堂子。其樂無窮。然而樂極每易生悲。因此有的思遺精。有的患白濁。這有所謂。本館代售的遺精歌(專治遺精)白濁丸專治白濁都是對症

(一) 試行療法

凡頭面突起硬塊。紅腫癢木。令嚼生黃薑。或飲薑油。如氣香味甘肥而不作嘔者。或捉蜘蛛。以盞蓋上。如蜘蛛雖咬不放而不逃避者。乃係真種火毒行瘡。可按法施治。間有風熱竊襲皮膚。亦起硬塊。麻痺如行。設不審確。貿然下疔。則藥重病輕。反致債事。可不慎哉。

(二) 試校腸痧法

凡夏令之霍亂爲害。令人有談虎色變之概。然則有吐有瀉之霍亂。定中州。分清濁。不難而施。且有一種乾霍亂。俗名絞腸痧。更厲害。上不得吐。下不得瀉。嘔噦煩渴。腹痛如絞。有二十四小時內畢命之能性。極宜早治。如始見腹痛。令嚼刺白生茅草。不厭生腥臭而味甘者是爲絞腸痧。可毒其因而早治之。其因有因寒因暑因積邪因積滯急欲救莫如嘔涎探吐最妙

外治剖法)

燈明海慾

青年與手淫  
(下)

[illegible]

本報主筆 楊志一 朱振聲  
醫士 醫士  
診 例

(甲)特號二元  
(乙)門診一元  
(丙)出診四元  
(丁)膏丸方四元  
(戊)急病隨請隨到

隨到隨診	時間	診所	電話
貧病減半	門診上午九時至下午四時	上海雲南路會樂里第三一弄第一號	三六九
路遠通加	出診四時以內		
次日取件			

掛號處啟

幸福報

紹儀署

期五二二第

(日五十月六年九十國民華中)

◆ 分二洋售份每 ◆

代國 現外 加本 倍外 五計 郵埠 廉律	內年 二個 月寄 資在	每 三 日 出 一 張	館址 上海 馬路 路	之元 均計 如方 於位 於五 新	每 期 每 一 格 共	廣告價目
--	----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------	------

定報價目

濕溫發動矣……（秦丙乙）  
治小兒溫疹兼泄瀉方……

青年與手淫……(周頌堯)

補報須知

試病法二則……………楊舒榮

瘧疾驗方……（沈仲圭）  
軍醫生活記……（余不平）

每分只收銅元兩枚。以答愛  
讀本報諸君之雅意。

幸福

### III

三六



